

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Δισυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων), υδροχόρων ζιζανίων και ξυλοδών φυτών. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ενζύμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Δενδροειδείς καλλιέργειες, αμπέλι, βαμβάκι, ακαλιέργειες εκτάσεις, κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών: αυστηρά εντοπισμένη εφαρμογή με ψεκαστήρα χειρός ή κατευθυνόμενος ψεκασμός με καλύτερα μεταξύ των γραβιών. **Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά:** καθολικός ψεκασμός. Ομοιομορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να ελθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιέργειών προς αποφυγή φωτοτοξικότητας ή συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. **Για την ορόβληση στον καπνό** εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύψεως της φυλλώσης. Χρησιμοποιείται μέσα τριπλό ακουάκι και ψεκαστό με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI). **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδραση. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδραση. Να μη χρησιμοποιείτε ακούθωτο ή ακούρωτο νερό για τη διάλυση του φαρμάκου. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μπουκάλια (φιάλες, δοχεία) ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρίψιμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΟΧΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΝΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** • Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή των καρπών με το σκευάσμα ή με το εδάφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί. • Να μην εφαρμόζεται στις άκρες χαρωτικών και σε στεγνά χαντάκια. • Να μην εφαρμόζεται σε υδάτινες περιοχές ή σε εδαφά που γεννιούνται αμέσως με υδατινές περιοχές συμπεριλαμβανομένων των χαντακιών και των αναχωμάτων των αρδευτικών. • Να μην επιτρέπεται η βόσκηση ζώων σε αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας στους οποίους έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα. • Να μη γίνεται ψεκασμός, αν ανέμεται βροχή σε 6 ώρες από τον ψεκασμό. • Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προσορίζονται για αποστείρωσή τους. • Μην φεκάκιζετε όταν φυσάει. • Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. • Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πευμιές στο εδαφός ελιές. • Να μη συλλέγονται ελιές από το εδαφός προκειμένου να αποσυρθούν υπολείματα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκευάσμα περιέχει τη δραστική glyphosate, η οποία ανήκει στην ομάδα 9 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και αναλκτικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

- **ΣΠΟΡΑΣ Η ΨΥΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατέσσερις (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.
- **ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Να μην ενοχληθείτε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φύλλα. Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά είναι ξερωμένα.
- **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. **ΣΥΝΟΧΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ** • Φοράστε κατά κλεισίωματα, μακριά από παιδιά. • Αποφύγετε να αναπνεύσετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/σταγονίδια/ατμούς/ ανεμοπύραξη. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον ψεκασμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτική ενδυμασία μέσα αποφυγής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο. • Φοράτε ολοήμερο φόρεμα εργασίας κατά την ανέγερση/ ορόβληση και κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση απεικόνισης στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φορέστε ολοήμερο φόρεμα εργασίας και μπότες. • Διάβητε περιχρυσόμυνο/περιεκτή σφιγμένα με την εθνική νομοθεσία. • Μη ρυπώνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιρρεπικά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωτότερες επιφάνειες και τους δρόμους). • Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους - χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την καλλιέργεια του βαμβάκιου. - να φέρσετε μίαν αψεκστική ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική ή χρησιμοποιήσιμη ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% για τις υπόλοιπες χρήσεις.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Απαράδεχτος αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Εξοσιώστε αμέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Συστήνεται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία όπως αυτή ενδεδειγμένη από την κατάσταση του ασθενή. Η θεραπεία με απορρόφηση και όξιμες δεν ενδεδειγμένα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777



Glyphosate (γκλυφοξέπ), ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

Εγγυημένο σύνθεση:
Δραστική ουσία: glyphosate 36% β/ο
(υπό μορφή άλατος Καλίου: 44,1% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 39% β/β

Αρ. Άδειας Διάθεσης στον Αγρό:
7928 / 24-09-2009

Δισυστηματικό, μη εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων), υδροχόρων ζιζανίων και ξυλοδών φυτών.

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος τίς άδειας, Υπεύθυνος επικουρικός, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
 Bayer Ελλάς ABE, Αγινολάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000
[www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropsscience.bayer.gr)



UFI: KPF1-E0Y7-K009-RH2Q
GROUP 9 HERBICIDE

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:



Αθήνα: 10 χλμ. Α. Παιονίας - Μαρκοπούλου, Τ.θ.100, 19002, Παιονία. Τηλ:210 6800 900
 Θεσσαλονίκη: Τ.θ. 1203, ΒΙ.Π.Ε.Θ., Σίνδος 57022, Τηλ: 2310 797907
info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΤΟΧΟΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΜΕΤΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ) (Μ.Α.Ε./Μ.Ε.): • **ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΑΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΚΡΕΠΠΟΥΡΟΥ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΑΜΠΕΛΙΑ** (Επιτραπέζιες & Ονομασμένες ποικιλίες). • **ΕΛΙΑ** (Επιτραπέζιες & Ελαιολατρικές ποικιλίες): α) **Ετήσια ζιζάνια** (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δεντροστοιχίας όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ώριμης τους ανάπτυξης. Δόση: 150-200 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μολόχα** (*Molva* sp.), **Αντράκλια** (*Portulaca oleracea*), **Πολυκόμμη** (*Polygonum* spp.), **Τουσκούνια** (*Urtica* sp.): Δόση: 400-600 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 1-3/28**. β) **Πολυετή ζιζάνια** (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δεντροστοιχίας όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Δόση: 500-600 κ.ε.κ./στρέμμα. **Αγριάδα** (*Cynodon dactylon*), Δόση: 800 κ.ε.κ./στρέμμα. **Βέλουρος** (*Sorghum halepense*), **Φτέρη** (*Pteridium aquilinum*): Δόση: 500 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 1-3/28**. **Κύπερη** (*Cyperus* sp.): 1η εφαρμογή κατά την άνθηση με Δόση 600 κ.ε.κ./στρέμμα και 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με Δόση 500 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 2**. • **ΒΑΜΒΑΚΙ**: Κατευθυνόμενος ψεκασμός με καλύτερο μεταξύ των γραβιών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. α) **Ετήσια ζιζάνια** (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Δόση: 150-200 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 1**. β) **Πολυετή ζιζάνια:** **Βέλουρος** (*Sorghum halepense*): Δόση: 500 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 1**. • **ΚΑΠΙΝΟΣ** Ορόβληση (*Orobancha cerasus*): Ψεκασμός καλύψεως: α) 40 ημέρες μετά τη μεταρύτευση με Δόση: 40 κ.ε.κ./στρέμμα και β) 60 ημέρες μετά τη μεταρύτευση με Δόση: 60 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 2**. • **ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ:** α) **Ετήσια ζιζάνια** (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ώριμης τους ανάπτυξης. Δόση: 150-200 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μολόχα** (*Molva* sp.), **Αντράκλια** (*Portulaca oleracea*), **Πολυκόμμη** (*Polygonum* spp.), **Τουσκούνια** (*Urtica* sp.): Δόση: 400-600 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 1, β) Πολυετή ζιζάνια** (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Δόση: 500-600 κ.ε.κ./στρέμμα. **Βέλουρος** (*Sorghum halepense*), **Φτέρη** (*Pteridium aquilinum*): Δόση: 500 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 1**. • **ΑΚΑΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ** (βιομηχανικές περιοχές, αγροοικονομικό χώρο, νεκροτόμια, πλατείες, πλάτες σε δρόμους και εθνικές οδοί, σε χώρους με φωταγωγά πετρέλαια, σε αστικές και αγροτικές περιοχές): α) **Ετήσια ζιζάνια** (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ώριμης τους ανάπτυξης. Στην περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί να καλυφθεί το πόδι το 50% της έκτασης αυτής. Δόση: 150-200 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μολόχα** (*Molva* sp.), **Αντράκλια** (*Portulaca oleracea*), **Πολυκόμμη** (*Polygonum* spp.), **Τουσκούνια** (*Urtica* sp.): Δόση: 400-600 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 1-3/21**. β) **Πολυετή ζιζάνια** (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Δόση: 500-1000 κ.ε.κ./στρέμμα. **Αγριάδα** (*Cynodon dactylon*), Δόση: 750-1000 κ.ε.κ./στρέμμα. **Βέλουρος** (*Sorghum halepense*), **Φτέρη** (*Pteridium aquilinum*): Δόση: 500 κ.ε.κ./στρέμμα. **Περικλοκλάδα** (*Convolvulus arvensis*), **Κίριο** (*Cirsium arvense*): Δόση: 1000 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 1-3/21**. **Κύπερη** (*Cyperus* sp.): 1η εφαρμογή κατά την άνθηση με Δόση: 600 κ.ε.κ./στρέμμα και 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με Δόση: 500 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 2**. γ) **Συλόμενες θάμνοι, Βάτα** (*Rubus* sp.): Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. Δόση: 500-1000 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 1-3/21**. • **ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΑΡΑΓΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ:** Υδροχόροι ζιζάνια: Κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων. Δόση: 800-1000 κ.ε.κ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε. 1**. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Σε όλες τις χρήσεις εφαρμόζεται με 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μόνο στον Καπνό, για την καταπολέμηση της Ορόβλης, εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. **Μέγιστη δόση ανά χρήση για το σύνολο των εφαρμογών /12 μήνες:** 432 γρ. glyphosate/στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Στις δενδροειδείς καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα τρυφερούς βλαστούς, παραρτήματα και μη επωλιμμένα πλήρως κλειστάς. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σπέρνους ή αμπελιές από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Molva* sp. (*Molagales*), *Urtica* sp. (*Toukounia*), *Polygonum* sp. (*Polukokina*), *Portulaca oleracea* (*Antraklia*), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.ε.κ./στρέμμα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. 3. Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνθήκες με δύο (1-2) εφαρμογές (γεμίζω-άνοξη) ή μία (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ώριμης τους ανάπτυξης. 4. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνθήκες μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση και την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. 5. Επιδόματα ή χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ για την αποφυγή φωτοτοξικότητας στις καλλιέργειες. 6. Η χρήση στη λεμονία περιλαμβάνει την κηρία. 7. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκ.στάσια. 8. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεπλύμα της κορυφής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μήλια, Αχλάδια, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά-Κηρία, Γκρέπ φρουτά, Αμυγδαλιά, Βερκοκιά, Ροδάκινια, Κεράσια, Ελιά, Αμπελιά: 7 ημέρες. **Βαμβάκι:** Καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής. **Καπνός, Αγροί** μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά, Ακαλιέργειες εκτάσεις -

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

