

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. • Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: Χρησιμοποιήστε επανειλημμένως ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην του προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει αντιδοτό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το mesotrione παρεμποδίζει την βιοσύνθεση της ηλαστοκινόνης με δράση στο ένζυμο 4-HPPD με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των καροτινοειδών. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεότυλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

Τρόπος εφαρμογής: Καθοδικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση και ψεκαστικό υγρό 30-40 λίτρα ανά στρέμμα. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, το ψεκαστικό υγρό να αναδεύεται συνεχώς.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την ουσιασμένη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

 **Camix**®
560 SE

syngenta.

GROUP 27/15 HERBICIDES

ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: 5J24-D02N-A009-3ESQ

Mesotrione (ομάδα τρικετόνες)
S-metolachlor (ομάδα χλωροσρακεταμίδια)

Εναιώρημα - γαλάκτωμα (SE)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
(ΑΑΔΑ): 7909/23.12.2008

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Mesotrione: 6% β/ο +
S-metolachlor: 50% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 44,02% β/β

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Α. Ανθούσης, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Ξίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
1^η χιλμ. Α. Παϊονίος Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,
19002, Παϊονία, Τηλ.: 210.68.00.900



1 lt e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME and the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Αραβόσιτος: Για Εισαθιθτα Ζιζάνια & Μετρίως Εισαθιθτα Ζιζάνια με δόση 200-280 κ.εκ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-40 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** α) Προφυτευτικό ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια. β) Νωρίς μεταφύτευτικό, στάδιο καλλιέργειας 2-3 φύλλα και τα ζιζάνια μόλις έχουν εμφανιστεί (αγρωστώδη μέχρι τα 2 φύλλα και πλατύφυλλα μέχρι τα 4 φύλλα). Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

Εισαθιθτα ζιζάνια: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Γλυστρίδα (Portulaca oleracea), Αγριοντομάτι (Solanum nigrum), Βλήτα (Amaranthus spp.), Λουβουδιά (Chenopodium album), Πράσιν ησάτρια (Setaria viridis), Αγριοπερίδι (Polygonum persicaria), Τάτουλας (Datura stramonium), Αγριομυρτίζιζαν (Xanthium strumarium), Αγριομαμακάκι (Abutilon theophrasti). **Μετρίως εισαθιθτα ζιζάνια:** Κίτρινη κίληρη (Cyperus esculentus).

Παρατηρήσεις: 1. Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαρεια εδάφη. 2. Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή αν δεν περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αραβόσιτος: ---

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίστει:
• Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπούκι και σε καλαμπούκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος την ίδια καλλιεργητική περίοδο.
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: • Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο (5 μήνες μετά την εφαρμογή) να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι και αϊκάλη) και χειμερινή ελαιοκράμβη και την επόμενη άνοιξη (12 μήνες μετά την εφαρμογή) πλιθάνας και βαμβάκι αφού προηγηθεί βαθιά άροση. • Να μην σπέρνονται ζαχαρότευτλα, παντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλι και σόγια πριν περάσουν 24 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις ουσιοτώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Αποτέφρωση σε υψηλές θερμοκρασίες. Η αποτέφρωση πρέπει να λαμβάνει χώρα σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις, σε θερμοκρασία ανώτερη των 1200°C όπου ο ελάχιστος χρόνος παρμονής στην υψηλόμονη θα πρέπει να είναι 2 δευτερόλεπτα.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

