



«Διαβάστε τις συνημένες οδηγίες πριν από τη χρήση»

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμενη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Διαθέστε του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αγέκαστη ώρη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, με φυτική καλυψη. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στάχους, να αφήσετε μιαν αγέκαστη ώρη προστασίας 10 μέτρων από ακαλείηντη γη. «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Πρώτες βοήθειες - Αντιδότο: Σε περίπτωση επαρφής με τα ματιά: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαρφή, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Σε περίπτωση επαρφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μερή του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέστε εγερτό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης. Αντιδότο: Δεν υπάρχει ειδικός αντιδότο. Εφαρμόστε συμπατωματική θεραπεία. ΚΤΛΕΦΟΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΩΝ: 2107793777

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

Katana®

ΕΝΑΙΟΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

ΑΑΔΑ: 70.161/27.05.2016

Εγγυημένη σύνθεση: Ριζασυμύριον (Φλαζασουλιφουρον)25% β/β, Βοηθ. ουσίες: 73,4 % (β/β)

Διασυστηματικό ζήανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων ζήανιν και αγρωτωδών ζήανιν, προφυτρωτικό ή νωρίς μεταφυτωτικά των ζήανιν, σε αμπέλι, ελιά και εσπεριδοειδή.

Κατόρθωσης της έγκρισης: ISK Biosciences Europe N.V.,

Pegasus Park, De Kleebaan 12B box 9, B-1831 Diegem, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διεύθυνση στην εγράφη:

7-3207-512-189-14/24

URL: 5Mj2-KQ54-OUVO-SUP9

Ημ/νία παραγνής, Αρ. Παρτίδας:

1' χιλ. Λ. Πανούς-Μαρκοπούλου, Τ.Β.100,

19002, Πανούς, Τηλ.: 210.68.00.900,

info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

Καθαρό βάρος: 50γραμ.

βλ. επί της συσκευασίας

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ Φρουτ, Κίτρα, κ.α.) (από το 40 έτος της φύτευσής τους): α) Για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων και αγρωστωδών ζιζανίων. Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων με δόση 20 γρ / στρέμμα (μέγιστο) ή 50-100 γρ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, β) Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων [*Portulaca oleracea* (Αντράκλα), *Amaranthus retroflexus* (τραχύ Βλήτο)]. Κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ανάπτυξη με δόση 6 – 8 γρ / στρέμμα σε συνδυασμό με Roundup Gold 36 SL, Rodeo TF ή Glialka TF σε δόση 240 ml/ στρέμμα ή με Roundup Ultra σε δόση 180 ml/ στρέμμα.

Ελιά (από το 40 έτος της φύτευσής τους): α) Για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων με δόση 20 γρ / στρέμμα (μέγιστο) ή 50-100 γρ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. β) Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων [*Calendula arvensis* (Καλέντουλα), *Erodium malacoides* (Βελονίδια μαλακοειδής), *Malva neglecta*, (Μολόχα), *Borrago Officinalis*, *Mercurialis annua* (Σκαρολάχανο), *Oxalis cernua* (Οξαλίδα)]. Κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ανάπτυξη με δόση 6 – 8 γρ / στρέμμα σε συνδυασμό με Roundup Gold 36 SL, Rodeo TF ή Glialka TF σε δόση 179.4-240 ml/ στρέμμα ή με Roundup Ultra σε δόση 134.5-180 ml/ στρέμμα.

γ) Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανιών [*Calendula arvensis* (Καλέντουλα), *Diplotaxis virgata*, *Erodium malacoides* (βελονίδα μαλακοειδής), *Urtica dioica* (Πολυετές τσουκνίδα), *Stellaria media* (Στελλάρια), *Lamium amplexicaule*, (δωδεκάνθη), *Malva neglecta* (Μολόχα), *Senecio vulgaris* (Μαρτιάκος), *Malva sylvestris* (κοινή μολόχα).

Κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανιών όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ανάπτυξη με δόση 6 – 8 γρ / στρέμμα σε συνδυασμό με Roundup Gold 36 SL, Rodeo TF ή Glialka TF σε δόση 200-264,4 ml/ στρέμμα ή με Roundup Ultra σε δόση 150-198,3 ml/ στρέμμα.

Αμπέλι (από το 4ο έτος της φύτευσής τους): α) Για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων ζιζανιών και αγρωστώδων ζιζανιών. Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης, προφυτρωτικό ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανιών με δόση 20 γρ / στρέμμα (μέγιστο) ή 50-100 γρ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. β) Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανιών [*Veronica persica* (Βερόνικα), *Sonchus arvensis* (πολυετής ζωχός)]. Κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανιών όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ανάπτυξη με δόση 6 γρ / στρέμμα σε συνδυασμό με Roundup Gold 36 SL, Rodeo TF ή Glialka TF σε δόση 200 ml/ στρέμμα ή με Roundup Ultra σε δόση 150 ml/ στρέμμα.

Για όλες τις καλλιέργειες: Ογκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 20-40.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Παρατηρήσεις: 1. Η ποσότητα σκευάσματος και ψεκαστικού υγρού που εφαρμόζονται στη γραμμή φύτευσης, θα πρέπει να υπολογίζεται βάση της πραγματικής επιφάνειας που θα ψεκαστεί. Για παράδειγμα σε αμπελώνα με απόσταση γραμμών φύτευσης 3 μέτρα, θα ψεκαστεί το 1/3 περίου της συνολικής επιφάνειας του αμπελώνα. Ανάλογα υπολογίζεται και η ποσότητα του glyphosate . 2. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα στο KATANA μέχρι το στάδιο των 2 – 4 φύλλων ή έως τα 10 εκ. ύψος. 3. Τα αποτελέσματα παρατηρούνται 5 – 10 ημέρες μετά τον ψεκασμό, ανάλογα με τη θερμοκρασία. 4. Ο συνδυασμός του με glyphosate, δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται χαμηλότερες δόσεις του KATANA (6 έως 8 γραμ./στρ), σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανάγκη για υπολειμματική διάρκεια δράσης του ζιζανιοκτόνου. 5. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάρκεια δράσης, να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζερίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή και να χρησιμοποιείτε τη μεγαλύτερη δόση/αναλογία KATANA. 6. Ο συνδυασμός του με glyphosate, είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις φθινοπωρινές εφαρμογές στην ελιά (σε φυτρωμένα ζιζάνια μετά τις βροχές), γεγονός που διευκολύνει τη συγκομιδή αφήνοντας το χώμα γύρω από τα δέντρα, καθαρό από ζιζάνια. 7. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp (μολόχα), Portulaca oleracea (αντράκλα) και Urtica spp. (τσουκνίδα) η δόση του glyphosate στο μήγμα βυτίου, μπορεί να αυξηθεί σε 144 γρ. δ.ο/ στρέμμα ψεκαζόμενης έκτασης, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους. 8. Μην ψεκάζετε έδαν αναμένεται βροχή μέσα σε 6 ώρες. 9. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.10. Να μην εφαρμόζεται σε αμπέλια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω προσβολής ασθενειών. 11. Να μην εφαρμόζεται σε ελαφριά εδάφη. 12. Να μην ψεκάζετε τα πράσινα τμήματα των καλλιεργειών (οφθαλμούς που έχουν ανοίξει, φύλλα, τσαμπιά, βλαστούς, κλπ.), άμεσα ή έμμεσα.

Καταπολεμούμενα Ζιζάνια

Ευαίσθητα ζιζάνια: *Bromus sterilis* (αγριοβρώμη)*, *Digitaria sanguinalis* (αιματόχορτο), *Lolium multiflorum*. (Ηρά) *, *Setaria verticillata*, *S. viridis* (Σετάρια), *Amaranthus retroflexus* (Βλήτο) *, *Capsella bursa-pastoris* (Καψέλλα) *, *Chenopodium álbum* (Λουβουδά), *Conyza canadensis* * (Κόνυζα), *Crepis sancta* * (Πικραλίδα), *Daucus carota* (Αγριοκαρώτο), *Epilobium tetragonum* (Επιλόβιο), *Erodium cicutarium* (Βελονίδι), *Geranium dissectum*, *G. rotundifolium*, *G. mole* ** (Γεράνι), *Malva sp.* ** (Μολόχα), *Picris echioioides** (Πικρίς), *Mercurialis annua* (Σκορολάχανο), *Senecio vulgaris* (Μαρτιάκος), *Stellaria media* (Στελλάρια), *Taraxacum officinale* (Αγριοράδικο)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: *Poa annua* (Ποα ετήσια) *, *Lactuca serriola* * (Αγριομάρουλο), *Sonchus asper*, *S. oleraceus* (Ζωχοί)

*Καταπολεμούνται καλύτερα προφυτρωτικά ** Καταπολεμούνται καλύτερα μεταφυτρωτικά

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Roundup Gold 36 SL, Roundup Ultra 48 SL, Rodeo TF και Glialka TF σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα. Προσθέστε πρώτα το KATANA στο ψεκαστικό υγρό και μετά το άλλο σκεύασμα.

Τρόπος δράσης: Απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων, μετακινείται μέσω της αποπλαστικής και συμπλαστικής οδού και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους.

Τρόπος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, τα άνθη, τις παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος των καλλιεργειών. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Εφαρμόστε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή με σκίσιμο (κουτιά, σακίδια), για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήστης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση που ζεριζωθούν τα δένδρα, μπορεί να σπαρούν σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη ή καλαμπόκι, ένα χρόνο μετά την τελευταία εφαρμογή με το KATANA.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό ύγρο από τα φυτά (6 ώρες).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή 45 ημέρες, Αμπέλι 75 ημέρες, Ελιά 45 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

7-3207-512-189-14/24



«Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση»

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμενη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Διαθέστε του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αγέκαστη ώρη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά υδάτα, με φυτική καλυψη. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στάχους, να αφήσετε μιαν αγέκαστη ώρη προστασίας 10 μέτρων από ακαλείηντη γη. «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη ψεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαρφής με τα ματιά: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαρφή, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Σε περίπτωση επαρφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρουχά και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μερή του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέστε εγερτό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικός αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπατωματική θεραπεία. ΚΤΛΕΦΟΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΩΝ: 2107793777

Katana®

ΕΝΑΙΟΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

ΑΔΔΑ: 70.161/27.05.2016

Εγγυημένη σύνθεση:

Ριζασυμύριον (Φλαζασουλ/φουρον)25% β/β.Βοηθ. ουσίες: 73,4 % (β/β)

Διασυστηματικό ζήανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων ζήανιν και σηρωτωδών ζήανιν, προφυτρωτικό ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζήανιν, σε αμπέλι, ελιά και εσπεριδοειδή.

Κατόρθωσης της έγκρισης: ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleebaan 12B box 9, B-1831 Diegem, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διεύθυνση στην εγράφη:

7-3207-512-189-14/24

URL: 5M12-KQ54-OUVO-SUP9



Ημ/νία παραγνής, Αρ. Παρτίδας:

1' χιλ. Λ. Πανούς-Μαρκοπούλου, Τ.Ε.100,

19002, Πανούς, Τηλ.: 210.68.00.900,

info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

Καθαρό βάρος: 50γραμ.