

# DiPel 2X

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά):** Καταπολέμα Φυλλοδέτες (*Archips rosanus*, *A. Rodanus*), Φυλλοφάγες κόμπες, Υπονομευτές (*Hyponomeuta Padellus*, *H. Malinella*), Δόση σκευάσματος: 25 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (37.5-62.5 γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 150-250 λίτρα/στρ. Εφαρμογές σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συστήματα, με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφιών κάθε γενιάς, όπως προκύπτουν από τη χρήση φερομονικών παγιδιών ανίχνευσης πληθυσμού. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 3-10 εφαρμογές (2-5 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 3-16 ημέρες εφόσον απαιτείται. **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιές, Πορτοκαλιές, Μανταρινιές, Γκρεπ-φρουτ, Κιτριά):** Καταπολέμα Ανθοτρήτη (*Prays citri*, *Cacoecia* sp.), Δόση σκευάσματος: 25 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (50-100 γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 200-400 λίτρα/στρ. Εφαρμογές σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συστήματα, οι εφαρμογές να ξεκινούν κατά την ανθοφορία με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφιών (L1). Η μεγαλύτερη δοσολογία εφαρμόζεται όταν υπάρχει αυξημένη πίεση προσβολής ή όταν απαιτείται μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 3-10 εφαρμογές (2-5 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 3-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά):** Καταπολέμα προνύμφες λεπιδοπτέρων (*Archips rosanus*, *A. rosanus*), Φυλλοφάγες κόμπες, Φυλλοδέτες (*Opina rotundifolia*, *Cacoecia rosana*, *C. rosana*, *Tortrix* sp., *Zeluseta rhytalis*). Δόση σκευάσματος: 100 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (50-150 γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών προνυμφιών (L1) της κάθε γενιάς. Η μεγαλύτερη δοσολογία εφαρμόζεται όταν υπάρχει αυξημένη πίεση προσβολής ή όταν απαιτείται μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 3-8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 6 ημέρες εφόσον απαιτείται. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερκοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Διασκακινιά):** Καταπολέμα προνύμφες λεπιδοπτέρων (*Anarsia lineatella*, *Laspeyresia molesta*, *Cacoecia rosana*, *C. rodana*), Υπονομευτές (*Hyponomeuta padellus*, *H. malinella*), Δόση σκευάσματος: 60-100 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (75-150 γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 100-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών προνυμφιών (L1) της κάθε γενιάς. Επανάληψη, αν χρειαστεί 3-16 ημέρες αργότερα. Η μεγαλύτερη δοσολογία εφαρμόζεται όταν υπάρχει αυξημένη πίεση προσβολής ή όταν απαιτείται μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 3-10 εφαρμογές (2-5 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 3-16 ημέρες εφόσον απαιτείται.

**ΕΛΙΑ:** Καταπολέμα την Ανθόβια γενιά Πυρηνοτρήτη (*Prays oleae*), Δόση σκευάσματος: 25γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (37.5-75 γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 150-300 λίτρα/στρ. Εφαρμογές σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Εάν δεν υπάρχουν προτείνεται μια εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη (όταν 5-25% των ανθέων έχουν ανοίξει) και την εμφάνιση των νεαρών προνυμφιών (L1). Η μεγαλύτερη δοσολογία εφαρμόζεται όταν υπάρχει αυξημένη πίεση προσβολής ή όταν απαιτείται μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού. Να γίνεται καλή κάλυψη των ανθέων. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 1-2 εφαρμογές, με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον υπάρχει μεγάλος πληθυσμός εντόμων. **ΑΜΠΕΛΙ:** Καταπολέμα προνύμφες λεπιδοπτέρων, Ευδεμίδα (κατά της 2ης και 3ης γενιάς) (*Polychrosis botrana*), Κογκυλίδα (*Euroscilia ampiguello*), Προνύμφες Φυλλώματες (*Mamestra* sp.), Δόση σκευάσματος: 50-100γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (100 γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 100 λίτρα/στρ. Εφαρμογές σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συστήματα ψεκασμοί μία εβδομάδα από την έναρξη πτώσεως της κάθε γενιάς του εντόμου. Να γίνεται καλή κάλυψη των ποτισμών. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 1-8 εφαρμογές (1-4 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υπαίθρου): Κραμβοειδή (Μπρόκολο, Λάχανο, Κουρουπίδι, Κινέζικο Λάχανο, Καρποφό Λάχανο), Σολανώδη (Τομάτες, Μελιτζάνες, Πιπεριές):** Δόση σκευάσματος: 100γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (50-100 γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. **Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύνθη, Πεπόνι), Φυλλώδη λαχανικά (Σκαρόλα, Μαρούλι, Σέσκουλα, Σπανιά), λαχανικά με στέλεχος (Αγκινάρα, Πράσο):** Δόση σκευάσματος: 100γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (75-100 γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 75-100 λίτρα/στρ. Καταπολέμα προνύμφες λεπιδοπτέρων, Πράσινο σκουλήκι (*Heliothis armigera*), Προνύμφες φυλλώματος (*Mamestra oleracea*, *M. brassicae*, *Plutella* sp., *Plutella xylostella*, *Plutella maculipennis*), Περίβια (*Pieris brassicae*, *Pieris rapae*.), (*Spodoptera exigua*, *Spodoptera* sp., *S. littoralis*), (*Noctuidae*, *Acrolepia assectella*, *Agrotis segetum*, *Depressaria erinaceella*, *Evergestis forficalis*, *Tuta absoluta*, *Ostrinia nubilalis*, *Plusia* sp., *Phytometra gamma*, *Trichoplusia ni*, *Vanessa cardui*). Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών προνυμφιών (L1). Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 1-8 εφαρμογές (1-3 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Θερμοκηπιοί): Σολανώδη (Τομάτες, Μελιτζάνες, Πιπεριές), Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύνθη), Φασόλια:** Καταπολέμα προνύμφες λεπιδοπτέρων, Πράσινο σκουλήκι (*Heliothis armigera*, *Heliothis* spp.), Προνύμφες φυλλώματος (*Mamestra oleracea*, *M. brassicae*, *Plutella* sp., *Plutella xylostella*, *Plutella maculipennis*), Περίβια (*Pieris brassicae*, *Pieris rapae*) (*Spodoptera exigua*, *Spodoptera* sp., *S. littoralis*), *Noctuidae*, *Acrolepia assectella*, *Agrotis segetum*, *Depressaria erinaceella*, *Evergestis forficalis*, *Tuta absoluta*, (*Plusia* sp., *Plusia chalcites* *Phytometra gamma*), *Trichoplusia ni*, *Vanessa cardui*, *Ostrinia furcatalis*. Δόση σκευάσματος: 100γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (50-100 γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών προνυμφιών (L1). Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 1-8 εφαρμογές (1-3 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **BAMBAKI:** Καταπολέμα προνύμφες λεπιδοπτέρων, Πράσινο Σκουλήκι (*Heliothis armigera*), Ρόδινο σκουλήκι (*Pectinophora gossypiella*). Δόση σκευάσματος: 30-50γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (15-40 γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 50-80 λίτρα/στρ. Εφαρμογές σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συστήματα οι εφαρμογές να ξεκινούν με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφιών (L1). Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 1-10 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

**ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ:** Καταπολέμα προνύμφες λεπιδοπτέρων, Πυραλίδα (*Ostrinia nubilalis*), Πράσινο σκουλήκι (*Heliothis armigera*), Σέξμια (*Sesamia cretica*, *Sesamia nonagrioides*), Δόση σκευάσματος: 40-50γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (20-50 γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφιών (L1) κάθε γενιάς. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 1-6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **ΚΑΠΝΟΣ:** Καταπολέμα Πράσινο σκουλήκι (*Heliothis armigera*), Δόση σκευάσματος: 30-50γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (15-75γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφιών (L1) κάθε γενιάς. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **ΡΥΖΙ:** Καταπολέμα προνύμφες λεπιδοπτέρων *Mythimna unipuncta*, *Spodoptera* sp. Δόση σκευάσματος: 200γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (100γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 40-50 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφιών (L1). Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ (Θερμοκηπιοί) (Γαρφαλιά, Γεράνια, Ζέρμπερες, Ιβίσκοι, Τριανταφυλλιά):** Καταπολέμα προνύμφες λεπιδοπτέρων και Φυλλοφάγες και ανθοφάγες προνύμφες, Πράσινο σκουλήκι (*Heliothis armigera*, *Heliothis* spp.), Σποντοπτερα (*Spodoptera exigua*), *Chrysodeixis chalcites*, *Mamestra* spp. Δόση σκευάσματος: 100-200γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (75-100γρ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος όγκος του νερού για πλήρη κάλυψη των φυτών. Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών προνυμφιών (L1). Η μεγαλύτερη δοσολογία εφαρμόζεται σε υψηλή πίεση προσβολής και εφόσον υπάρχουν μικτοί πληθυσμοί προνυμφιών. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 1-8 εφαρμογές (1-3 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΑ (Πεύκα, Βελανιδιά):** Καταπολέμα Φυλλοφάγες προνύμφες όπως Πιτκοκίμη (*Thaumettopaea pityocampa*) με ψεκασμό τον Σεπτέμβριο, Λυμάντρια (*Lymantria dispar*) με ψεκασμό φυλλώματος τον Απρίλιο /Μάιο, Υφάντρια (*Hyphantria cunea*), Μαλακόσωμα (*Malacosoma* spp.) με ψεκασμό φυλλώματος τον Μάιο /Ιούνιο. Δόση σκευάσματος: 75-150γρ./στρ. Όγκος ψεκ.υγρού: Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος όγκος του νερού για πλήρη κάλυψη των φυτών. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 3.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:** Καταπολέμα Ερστήια (*Erphestia elutella*). Δόση σκευάσματος: 50γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Εφαρμογή με ψεκασμό της επιφάνειας των αποθηκών. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./ καλλ. περίοδο: 1.

## DiPel 2X

**Παρατηρήσεις:** 1. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός. Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπούν το σκεύασμα. Μετά την κατάποση οι κόμπες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές μέρες. 2. Μη ψεκάσετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά τον ψεκασμό τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί. 3. Όταν εμφανιστούν τα μεγαλύτερα στάδια της προνύμφης, εφαρμογές με χρήση χημικών εντομοκτόνων ή άλλων παρασποκτόνων μπορεί να είναι απαραίτητες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψους φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το βυτίο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου όγκου και θέστε σε λειτουργία την ανδύευση. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό. Προσθέτετε το πυκνό διάλυμα στο μισογεμάτο με νερό ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με νερό υπό συνεχή ανδύευση. Συνέχιστε την ανδύευση κατά τον ψεκασμό, το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να βρίσκεται από συνεχή ανδύευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το βυτίο εφαρμογής και ξεπλύνετε τρεις (3) φορές καλά με νερό. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα πλαστικά σακίδια ή σακούλες, ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τους χάρτινους φακέλους ή κουτιά που θα καταστραφούν προηγούμενες με σκόμιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εγκαθίστανται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:---** **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το προϊόν περιέχει *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* και θεωρείται χρήσιμο εργαλείο στη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Οστόσο για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας, σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: --** **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φύσιο δράσης και για τις συστατώμενες δόσεις εφαρμογής. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Να είναι της καλλιέργειας:** 0 ημέρες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, σκοτεινό, δροσερό, μακριά από το ηλιακό φως και σε θερμοκρασία μέχρι 30°C. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Αρ. Παρτίδος - Ημ. Παρασκευής - Ημ. Λήξης βλέπε επί της συσκευασίας



ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

ΑΑΔΑ: 14673/21-08-2018

Εγγυημένη Σύνθεση: δραστική ουσία : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain ABTS-351 MPCA 64 % β/β (ισοδύναμο με 32.000 IU/mg) βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% β/β

**Εντομοκτόνο στομάχου για την καταπολέμηση προνυμφών των λεπιδοπτέρων. Το προϊόν δρα από στομάχου και πρέπει να καταποθεί από τις προνύμφες για να είναι αποτελεσματικό. Λίγες ώρες μετά την κατάποση οι προνύμφες παύουν να τρέφονται και πεθαίνουν τις επόμενες μέρες.**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΒΙΟ**  
ΚΑΤΑΛΛΑΛΟ ΓΙΑ  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Κάτοχος της έγκρισης: Sumitomo CAE SAS  
104 rue de la Voie Lactee, St Didier au mont d' Or,  
Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική  
διάθεση στην αγορά:



1<sup>ο</sup> χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία,  
Τηλ.: 210.68.00.900 , info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

® Εγκεκριμένο εμπορικό σήμα  
**VALENT BioSciences**  
Valent BioSciences LLC  
1910 Innovation Way, Suite 100  
Libertyville, IL 60048 U.S.A.  
Phone: 1-800-323-9557

## DiPel 2X



**ΠΡΟΣΟΧΗ.**  
Προκαλεί ερεθισμό του  
δέρματος. Προκαλεί σοβαρό  
οφθαλμικό ερεθισμό.  
Περιέχει *Bacillus*  
*thuringiensis* subsp. *kurstaki*.  
Μπορεί να προκαλέσει  
αλλεργική αντίδραση.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:-** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. -Αποφεύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα. - Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο (μάσκα με φίλτρο). - Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. - Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν το άτομο δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣ:** Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί εύκαλης, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:**  
210 77 93 777

**ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:**  
**500γρμ.**

215